

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата "Ваньтун АРТИПЛАС"**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЛСР-001292/10-240210

**Торговое название:** Ваньтун АРТИПЛАС ®

**Лекарственная форма:** пластырь, 7 x 10 см 2 шт., пакет из комбинированных материалов №3

**Состав** (на 100см<sup>2</sup> пластыря): экстракт густой из смеси обработанного растительного сырья (экстрагент-этанол 50%): (аконита Кузнецова, корнеклубни; борца Кармишеля, корнеклубни; дудника даурского, корни; коридалиса яньхусо, корневища; коричника китайского, кора; любистока сычуанского, корневища и корни; сафлора красильного, венчики цветков; сизигиума гвоздичного, цветочные почки; соломоцвета двузубого, корни) – 0,225 г, рацементол- 0,050 г, дифенилгидрамин гидрохлорид – 0,018 г, метилсалицилат- 0,020 г и вспомогательные компоненты: каучук натуральный, литопон, канифоль, медицинское вазелиновое белое масло, ланолин безводный.

**Описание**

Полоска хлопчатобамужной ткани с перфорацией, с липким слоем пластырной массы от светло-коричневого до коричневого цвета специфического запаха, покрытая сверху антиадгезионным защитным слоем бумаги.

**Фармакотерапевтическая группа**

Противовоспалительное средство для местного применения

**Код АТХ:** M02AX

**Фармакологические свойства**

Оказывает местное противовоспалительное и выраженное анальгезирующее действие, обусловленные местными рефлекторными реакциями (в том числе улучшение микроциркуляции крови в очаге поражения). Анальгезирующий эффект развивается к 4 дню лечения и усиливается в последующие дни применения препарата.

**Показания к применению**

В качестве местного обезболивающего средства в комплексном лечении остеоартроза

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Открытые раны, нарушение целостности кожного покрова или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема), беременность, период кормления грудью, возраст до 18 лет.

**Способ применения и дозы**

Наружно. Удаляют защитную бумагу и накладывают пластырь на чистую и неповрежденную кожу на 12-24 часа. Курс лечения составляет 14 дней. В зависимости от выраженности клинических проявлений, по рекомендации врача, возможны повторные курсы лечения.

**Побочное действие**

В редких случаях возможно покраснение кожи или зуд в месте аппликации пластыря. Возможны аллергические реакции

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Нестероидные противовоспалительные препараты оказывают синергидное действие.

**Особые указания**

При покраснении кожи или появлении зуда в месте наложения пластыря рекомендуется нанесение небольшого количества нейтрального крема (вазелина) перед очередной аппликацией

**Форма выпуска**

Пластырь. По 2 пластыря в пакете из ПЭТ/А1/ПЭ, по 3 пакета вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 20°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года. Не использовать после окончания срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

По рецепту.

**Производитель:**

Тунхуа Ваньтун Фармацевтикал Сток Ко.Лтд. (Tonghua Wantong Pharmaceutical Stock Co.,Ltd). Адрес: Китай, 134001, Провинция Цзилинь, г. Тунхуа, ул. Ваньтун, № 66, Wantong Road, Tonghua City, Jilin Province, 134001, China., телефон.: 86-4353945866; Fax: 86-4353336966.

**Организация, принимающая претензии потребителей:** ООО «Вань Тун». 109316, Москва, а/я 20.

Телефон.: (495) 5066640